

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas.
- Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos

En este prospecto:

1. Qué es DERTRASE y para qué se utiliza
2. Antes de tomar DERTRASE
3. Cómo tomar DERTRASE
4. Posibles efectos adversos
20. Conservación de DERTRASE

DERTRASE[®]
pomada

Cada 100 g de pomada contienen como principio activo 500 mg de Tripsina, 500 mg de Quimotripsina, 200 mg de Hidrolizado de ácido ribonucleico, 200 mg de Acido l-carbamil-glutámico, 200 mg de Metionina (D.C.I.), 200 mg de Meso-inositol, 2 g de Nitrofural (D.C.I.).

Los excipientes son: Macrogol 400, Macrogol 4000.

Titular y Responsable de la fabricación:

LABORATORIOS Q PHARMA S.L.
C/ PORTUGAL 27 ENTLO C
ALICANTE

1. QUÉ ES DERTRASE Y PARA QUÉ SE UTILIZA

DERTRASE se presenta en forma de pomada. Cada envase contiene 15 o 40 g de pomada. La pomada presenta un característico color amarillo.

DERTRASE está indicado para:

- Heridas y úlceras tórpidas e isquémicas que presentan necrosis o detritus.
- Úlceras por decúbito.
- Quemaduras de segundo y tercer grado.
- Limpieza enzimática de fístulas y trayectos de drenaje.
- Piodermitis.
- Ántrax.
- Furunculosis.
- Adenitis supuradas.
- Lesiones fungoides postoperatorias.
- Mastitis.
- Desgarros de periné, etc.

2. ANTES DE TOMAR DERTRASE

No use DERTRASE:

- Si es alérgico a cualquiera de los componentes de la especialidad.

Tenga especial cuidado con DERTRASE:

La mayoría de los antibióticos, principalmente la penicilina, retardan el proceso cicatrizal y disminuyen la actividad de los enzimas tripsina y quimotripsina, lo cual deberá tenerse en cuenta cuando, juntamente con el DERTRASE, se utilice tópicamente otro tipo de preparados.

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

3. CÓMO TOMAR DERTRASE

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con DERTRASE. No suspenda el tratamiento antes.

Extiéndase una capa delgada de pomada sobre la lesión. Las curas pueden renovarse dos o más veces al día, previo lavado con agua de los residuos anteriores.

En algunos casos conviene introducir la pomada por debajo de las escaras o instilarla directamente en cavidades y trayectos fistulosos.

Si Vd. toma más DERTRASE del que debiera:

No se ha descrito ningún caso de intoxicación por efectos de este producto.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, DERTRASE puede tener efectos adversos.

En los pacientes hipersensibles al nitrofuril, pueden ocasionalmente presentarse manifestaciones cutáneas de tipo alérgico, que desaparecen al suspender el tratamiento.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE DERTRASE

Mantenga DERTRASE fuera del alcance y de la vista de los niños.

No es preciso tomar precauciones especiales de conservación.

Caducidad:

No utilizar DERTRASE después de la fecha indicada en el envase.

Otras presentaciones:

DERTRASE: Envases con 15 y 40 g.

SIN RECETA MEDICA

Este prospecto ha sido aprobado en julio de 2004.